

**Beschreibung und Erklärungsversuch
einer mit ‚amniotischen Bändern‘ behafteten
menschlichen Missbildung.**

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe.

Unter dem Präsidium

des

HERRN PROFESSOR DR. C. KUPFFER

der medicinischen Fakultät

der

k. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt

von

P. H. TESDORPF

approb. Arzt

aus

Rio de Janeiro.

Mit zwei Figuren-Tafeln.

München, 1883.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.





Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41554602_0200

**Beschreibung und Erklärungsversuch
einer mit ‚amniotischen Bändern‘ behafteten
menschlichen Missbildung.**

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe.

Unter dem Präsidium

des

HERRN PROFESSOR DR. C. KUPFFER

der medicinischen Fakultät

der

k. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt

von.

P. H. TESDORPF

approb. Arzt

aus

Rio de Janeiro.

Mit zwei Figuren-Tafeln.

München, 1883.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

SEINEM EDLEN GROSSVATER

D^R. LUDWIG OPPENHEIMER

O. A. RATH A. D.

I N L Ü B E C K

IN DANKBARKEIT GEWIDMET

VOM

VERFASSER.

*Man verlangt, dass eine schriftliche Arbeit, einem
Gemälde gleich, einen Rahmen trage. Der Rahmen
vorliegender Schrift sei der Dank, welchen ich Ihnen,
Herr Professor KUPFFER, ehverbietig darbringe.*

Im Oktober 1882 ward das mißgestaltete Kind, dessen Besprechung folgt, von einer Frau, die sich als Hebamme ausgab, dem Hausmeister der anatomischen Anstalt zu München mit der Angabe überliefert, daß es vor wenigen Stunden geboren sei und eine Stunde lang geathmet habe.

Da der Hausmeister die Ueberbringerin nicht nach ihrem Namen fragte, sie von selbst nicht wiederkehrte, so ist erklärlich, daß unermittelt blieb, ob die Person wirklich Hebamme war und unter welchen Umständen die Geburt des Kindes erfolgt war.

Das Kind war bei der Uebergabe in der That todt, aber frei von Spuren eines gewaltsamen Todes und ordnungsgemäß abgenabelt. Vom Hausmeister sogleich in 50 procentigen Spiritus gebracht ward es drei Tage später für siebenzig Stunden in Wasser versetzt und während dieser Zeit, unter sorgfältiger Bewahrung vor dem Eintrocknen, in der Art der beigefügten Abbildungen gezeichnet. Nachdem es gezeichnet war, wurde das Kind in ungefähr 60 procentigen Spiritus gelegt. Es blieb diesem ausgesetzt, während die äußere Untersuchung stattfand.

Aeussere Untersuchung.

Es liegt ein Mädchen vor uns, das im Ganzen den Eindruck eines Fötus vom siebenten Monate macht. Es ist am Hinterkopfe mit dem einen Ende des Mutterkuchens verwachsen, zeigt im Gesicht, an Händen und Füßen mannig-

fache Mißbildungen und regelwidrige Färbung in der rechten Stirngegend.

Das Anliegen des Kinnes an der Brust, die leichte Wölbung des Rückens, die Beugung der Oberschenkel in den Hüft-, der gekreuzten Unterbeine in den Knie-Gelenken, so wie die seitlich vorn der Brust angeschmiegtten Oberarme, die vor derselben neben einander liegenden spitzwinklig gebeugten Unterarme kennzeichnen die Haltung der Frucht als eine im Allgemeinen regelrechte. — Der Hals ist in geringem Grade nach links gedreht. Der linke Unterschenkel zeigt sich ver-
schmächtigt und verbogen.

Der Thorax ist — der Breite der Zwischenrippenräume nach zu schließten — auf's Aeufserste erweitert. Aus dem After tritt schon bei gelindem Zusammenpressen des Abdomen reichliches Mekonium. Zwischen den wallartigen grossen Schamlippen ragt hügelartig das kleine Lippenpaar, zwischen Frenulum und Präputium die Clitoris hervor.

Die Gesammtlänge des gestreckten Kindes vom Scheitel bis zur Ferse misst 31'5 Cm., — die Länge vom Scheitel bis zum Schwanzbeinende 21,5 Cm. Die Schulterbreite ist 8, der Trochanteren-Abstand 5 Cm.

Das Gesammtgewicht der Frucht und ihrer Häute betrug am 26. Oktober 831,5 Gr. Das Gewicht der Frucht allein bei aufserhalb der Wagschale gestützt aufliegenden Eihäuten mafs 655 Gr., das der für sich in ähnlicher Weise gewogenen Eihäute 210 Gr.

Die **Fruchthäute** im Zusammenhange gleichen in Fig. I einer Tasche, die mit der Oeffnung abwärts gekehrt ist. Die mächtigere hintere Wand dieser Tasche wird von der Placenta P gebildet. Von deren Rande schlagen Chorion C und Amnion A mit einigen dem ersteren anhaftenden Deciduaafetzen zur Bildung der vorderen Taschenwand sich um. Die Oeffnung der Tasche entspricht der Stelle des Eihautrisses, misst als Kreis gedacht im Durchmesser 7,5 Cm. und überragt in ihrem

hinteren Abschnitte mit nahezu glattem Rande die Verwachungsstelle V des Mutterkuchens mit dem Kindskopf sowie das untere Ende der Placenta.

Die Placenta bietet regelrechte Beschaffenheit, durch feichte Furchen gut begrenzte Cotyledonen und quer über die Uterinfläche verlaufend und dieser fest anhaftend einen 1 bis 2 Cm. breiten Streifen geronnenen Blutes. Sie gleicht einer Niere, deren größte Länge 16 Cm., deren größte Breite 10 Cm. beträgt und deren Dicke zwischen 1,1 und 2,8 Cm. schwankt.

Beim Einblick in die Tasche gewahrt man das Amnion soweit es deren vordere Wand auskleidet durchweg glatt, an seiner Placentafläche aber in zahllose feine, kreuz und quer verlaufende, leicht verstreichbare Falten gelegt. Dieselben fehlen nahezu, wo die Blutgefäße des Mutterkuchens wallartig hervorragen, treten dagegen an der Wurzel des Nabelstranges mächtiger auf, hier zu größeren, nicht verstreichbaren Falten eines manschettenartigen Faltenkegels sich vereinigend. Die Basis dieses Kegels ist zugleich Ursprungsstelle der Nabelschnur und liegt excentrisch zur Placenta-Innenfläche. Aus den Falten des an einer Seite gerissenen, der Nabelschnur zum Theil schlaff anliegenden Kegel-Mantels heben sich drei Faltenzüge scharf hervor, deren niedrigster an der Spitze des Mantels sich verliert, während die zwei anderen zu einem auf die Nabelschnur sich weiter fortsetzenden Strange zusammentreten.

Die Nabelschnur inserirt in der Mitte des Mesogastrium. Sie ist im Allgemeinen 7 Mm. breit und zerfällt in ein 4 Cm. langes fötales und ein 19,5 Cm. langes placentares Schnittstück. Bis zur Schnittstelle der Nabelschnur läßt der erwähnte Strang sich längs der einen Seite der Nabelschnur verfolgen. Er entspricht einer Chorda funiculi. Zwei andere, vielfach unterbrochene Chordae laufen der genannten parallel. In querer Richtung theilen zwei sogenannte falsche Knoten das placentare Schnurstück in drei nahezu gleich lange Theile.

Das fötale Schnurstück trägt nur einen solchen Knoten. Ähnlich dem placentaren bietet der fötale Schnurtheil an seiner Ansatzstelle oberflächliche Faltung dar. Eine der Chorda des placentaren Schnurstückes entsprechende Verdickung ist am fötalen Schnurtheil nicht zu finden. Gleichwohl stoßen wir hier auf eine Bildung, wie sie dort nur von der Chorda ihren Ursprung nimmt. Es handelt sich um zipfelartige feitliche Ausläufer der Nabelschnur. Zwei derselben a^0 und a in Fig. I. finden sich in einem gegenseitigen Abstände von 11 Cm. am freien Theil des placentaren Schnurtheils, zwei andere an der Wurzel des placentaren und dem Knoten des fötalen Schnurstücks. Nur der diesem Knoten sich entwindende 6 Mm. lange Zipfel geht ohne Vermittlung einer Falte aus dem Nabelstrang hervor. Die drei anderen — 6 —, 7 und 13 Mm. langen Ausläufer entspringen faltenartig als platte, am Ursprunge 6 Mm. breite Zipfel aus der Amnionscheide. Alle vier Ausläufer tragen die Farbe der Amnionfläche der Nabelschnur und sind zu feinen Fäden ausgezogen, an deren freiem Ende mit Hilfe der Lupe eine Rißfläche nicht erweisbar ist. Durch ihre Form und ihren Zusammenhang mit der Amnionscheide verdienen die Ausläufer den Namen „Amniotische Zipfel.“

Als amniotisches Band ist ein 2 Cm. langer Fortsatz zu bezeichnen, der dort, wo in Fig. I a^4 der obere Rand des Nabelstranges sich mit dem Placentarande kreuzt, mit 1 Mm. breiter Basis aus einer unverstreichbaren, 7 Mm. langen Falte des placentaren Amnion hervorgeht. Er ist in Fig. I von der vorderen Taschenwand verdeckt. Lupenvergrößerung läßt an seinem verjüngten freien Ende eine Rißfläche unterscheiden.

Den mächtigsten Faltenwurf des Amnion trifft man im Bereiche der schon erwähnten Kopfverwachsung V. Diese wird vermittelt von einer frontal zum Kinde gestellten 17 Mm. breiten, 4 Mm. dicken Bandmasse, deren oberflächliche Bekleidung in die fötale Kopfhaut einerseits, anderseits in das Amnion

des benachbarten Placentaendes übergeht. Dieser Uebergang erfolgt in der Weise, daß von einer freien Brücke, die der Strang vom Mutterkuchen zum Kinde schlug, kaum sich reden läßt. Die 17 Mm. breite fötale Ansatzstelle des Stranges gehört der linken Schädelhälfte an und liegt längs einer Linie, welche parallel der Kranznaht von den Spitzen beider Ohren aus durch den Haarwirbel des Hinterkopfs zu ziehen ist. Der Haarwirbel liegt in der Kopf-Mittellinie; 25 Mm. von ihm entfernt liegt das mediale Ende der fötalen Ansatzstelle jenes Stranges. Nackenwärts bildet diese Ansatzstelle die Basis einer dreiseitigen Cutislücke. Die Bandmasse selbst zeigt vorderseits einen in Fig. I abwärts laufenden Längsriß, dessen Verlängerung ein Cutisriß in der mittleren Scheitelgegend darstellt. Aufwärts geht die Bandmasse unter Bildung zweier seitlicher Falten in die Amnionbekleidung der Placenta über.

Von diesen Falten gleicht die rechterseits gelegene von der Fläche einem gleichschenkligen Dreieck. Sie entspringt mit 25 Mm. breiter Basis und trägt an ihrer von dieser 6 Mm. weit entfernten Spitze einen nach Farbe, Form und Härte möhrenartigen Zapfen a^1 ; derselbe hat eine Länge von 15 Mm. und läuft in einen etwa ebenso langen, dünnen, freidendigen Wurzelfaden aus. Die linkerseits entspringende Falte a^3 mißt an der Ursprungsstelle 15 Mm. und verjüngt sich kaum entstanden zu einem weißlichen Bande, das 18 Mm. lang, 2 Mm. breit — mit ebenso breiter fetziger Rißfläche endet. Rechts von dieser Falte birgt das Verwachsungsband eine von glatter Haut ausgekleidete, dem Schädel zu offene, 1 Cm. tiefe Tasche, deren als Kreis gedachte Oeffnung 7 Mm. im Durchmesser mißt. Ein dritter, abgerissen endender, 9 Mm. langer, 2 Mm. breiter Bandzug findet sich in Fig. I a^2 zwischen den beiden eben beschriebenen Seitenfalten und dem Nabelstrange. Mit Rücksicht auf Gestalt und Herkunft sind alle drei Faltenbänder als „Amniotische Bänder“ zu bezeichnen.

Diesen amniotischen Fortsätzen der Placenta schickt der **Fötus** vom Gesichte her drei gleichgerichtete häutige Fortsätze entgegen, deren zum Theil rissige, zum Theil fadenförmige Endigungsweise die Vermuthung aufdrängt, dafs zwischen beiden Gruppen von Fortsätzen ein Zusammenhang bestand.

Bei Beschreibung des Gesichtes werden diese Gesichtsfortsätze ausführlich behandelt werden. Vorerst hat uns die äufsere Beschreibung des Hirnschädels zu beschäftigen.

Das **Aeussere des Hirnschädels** zeigt, wie aus Fig. I und Fig. II ersichtlich ist, Unregelmässigkeiten der Form wie der Zusammensetzung. Drei Kopfgeschwülste, drei Cutislücken und eine Anzahl durch äufsere Betaftung erweisbarer Defecte in der Knochendecke bezeugen dies.

Bei Untersuchung der Knochenlücken fallen die teigige Beschaffenheit des Schädels und die mangelhaftere Entwicklung seiner linken Knochenhälfte auf. Vom Scheitelbeine dieser Seite ist, soweit von Aussen durch Betaften sich ermitteln läfst, nur der Abschnitt, welcher an die Schläfenschuppe stöfst, vorhanden; diese selbst ist von Aussen durchföhlbar. Die Schuppe des Hinterhauptbeins scheint auf der linken Seite unvollständig und von der Pars frontalis des linken Stirnbeins nur eine etwa 7 Mm. breite Spange dazusein, die sich von der Gegend der Pars nasalis schräg nach oben und links 2 Cm. weit erstreckt. Auf der rechten Seite scheinen Hinterhaupts- und Schläfen-Schuppe vollständig, ist das Scheitelbein zum gröfsten Theil vorhanden. Die Pars frontalis der rechten Stirnbeinhälfte fehlt allem Anscheine nach in toto.

Ein über die hervorragendsten Hinterhaupts- und Stirn-Theile horizontal angelegtes Bandmaafs trifft die Kuppen zweier der erwähnten Kopfgeschwülste, von denen die linkerseits am Hinterkopf befindliche H^3 die Gröfse einer Haselnufs, die in der rechten Stirngegend gelegene H^1 fast Wallnufsgröfse bietet. Als Schädelumfang ergibt das in erwähnter Weise angelegte Bandmaafs 23,5 Cm. Unzuverlässiger als

dieses sind bei der erheblichen Verschiebbarkeit des Schädelinhaltes die übrigen, daher nicht erwähnten Kopfmaasse. Haselnussgröfs ist auch die dritte, in der rechten hinteren Scheitelgegend liegende Geschwulst H², welche nicht wie die zwei anderen nur von behaarter Kopfhaut überzogen ist, sondern zum Theile auch von einer unter dieser hervorkommenden roth und gelb gefleckten, in der Medianlinie zu einem weifslichen Strange verdichteten Membran.

Im Bereiche dieser Membran fällt in Fig. I als erster Hautdefect die elliptische, 28 Mm. lange, 16 Mm. breite Cutispalte S auf. An deren hinterem Umfange liegt von dem Verwachsungsbande in Fig. I verdeckt der dreiseitige, von einer Fortsetzung des Amnion geschlossene zweite Hautdefect. Das Verwachsungsband bildet die Basis dieses Dreiecks, dessen Spitze 18 Mm. rückwärts liegt und dessen Ränder falzartig von der mit Lanugo besetzten Schädelhaut sich absetzen. Die dritte ebenfalls dreiseitige Cutisunterbrechung reicht mit ihrem unteren Theile in das Gesicht und kann nur im Zusammenhange mit dem Gesichtschädel verständlich beschrieben werden.

Das **Aeussere des Gesichtsschädels** ist asymmetrisch. Auf der rechten Seite ist er erheblicher verunstaltet, als auf der linken. Dieser Eindruck wird dadurch noch gesteigert, dafs die Geschwulst der Stirngegend rechts gelegen ist. Die äufsere Nase fehlt allem Anscheine nach vollständig.

Als Basis der Gesichtstopographie diene eine Linie, welche die beiden in grossem Abstände von einander gelegenen Augen mit einander verbindet. Die Verzerrung der Gesichtstheile ist daraus ersichtlich, dafs oberer Mundrand, unterer Rand der beiden in Fig. II sichtbaren Oeffnungen Y¹ und Y², sowie die oberen Ränder der beiden unteren Augenlider in diese eine Horizontale fallen. Diese Horizontale ist 5,5 Cm. lang; sie verbindet die äufseren Winkel beider Augen quer über die Nase, trifft seitlich verlängert in Fig. I die Spitze des linken, in Fig. II die des rechten Ohres und verläuft in Fig. I in

halber Höhe des Vorderkopfes. Der linke Abschnitt der horizontalen Leitlinie fällt zusammen mit dem Berührungsfalz der Lider des linken Auges; unterhalb des Mitteltheiles klafft der Mund, oberhalb desselben erblickt man in Fig. II zwei Oeffnungen, in Fig. I zwei scheitelwärts gerichtete Hautzipfel; rechterseits bildet die Horizontale in einer Ausdehnung von 26 Mm. die Basis der bereits erwähnten dreieitigen Cutisunterbrechung.

Diese Unterbrechung läßt in Fig. II die Oeffnung Y¹, den rechten Bulbus und eine Schwarte zu Tage treten, welche — durch ihre fleckigrothe Farbe, den Mangel an Behaarung und schwierigere Faltbarkeit von Schädel- und Gesichtshaut unterschieden — der Gesichtshaut ähnlich eine Anzahl Runzeln trägt. Die Beziehung dieser Runzeln zur rechten Nase und zum rechten Auge ist aus Fig. II ersichtlich, so gut, wie die Beziehung einer unterhalb der Dreiecksbasis laufenden Furche zum rechten unteren Augenlide. Die in der Mitte der rechten Stirn gelegene Dreiecksspitze steht 21 Mm. von der Basis ab. Der laterale Rand des Dreiecks ist 26 Mm. lang, der mediale 13 Mm. Alle drei über das Niveau der Dreiecksfläche leicht erhobenen Ränder sind durch im Allgemeinen feichte Falzung von dieser abgesetzt. Der untere Theil des lateralen und der laterale Theil des unteren Randes bestehen aus Lidrandtheilen, in deren Bereich der Falz bis zu 5 Mm. sich vertieft. Der untere Lidrand ist grob gekerbt, im medialen Theile frei von Wimpern und gleich dem oberen mit einer Längsrille versehenen, mit Wimpern reich besetzten rechten Lidstück, gleich den regelrechten Lidrändern des linken Auges 12 Mm. lang. Auch der mediale Dreiecksrand zeigt sich — und zwar im mittleren Drittel — mit wimperartigen Haaren wohlversehen. In dem rechten Lidwinkel liegt der etwas collabirte rechte Bulbus mit querelliptischer, in der Quere 5 Mm., in der Höhe 2 Mm. messender undurchsichtiger Hornhaut vor. Der regelrechte linke Augapfel wird dagegen

erst nach Erweiterung des unverklebten Lidspalts mit runder, 5 Mm. breiter, trüber Hornhaut unter normalen Lidern sichtbar. — Von den beiden anderen Winkeln der dreieckigen Cutisunterbrechung läuft der obere in eine fast 0,5 Mm. schmale, 7 Mm. lange Cutispalte aus. In der dem Scheitel zugewandten Richtung dieser Spalte schließt ein 12 Mm. langer, in einen feinen Faden ausgezogener Hautzapfen mit 2 Mm. breiter Basis an. Dieser Zapfen, Z^1 in Fig. I und II, ist der rechte der erwähnten drei Gesichtszipfel. Er ist, soweit das ihm fest anhaftende geronnene Blut erkennen läßt, von Cutis überzogen. — Der mediale Dreieckswinkel enthält einen Zugang zur rechten Nasenhöhle. Er grenzt mit feinem medialen Schenkel an einen Hautbalken, der 9 Mm. lang, 2 Mm. breit, 4 Mm. dick, — in Fig. II die genannte, 6 Mm. breite Oeffnung Y^1 von einer anderen, nur 2 Mm. weiten Oeffnung Y^2 scheidet. Bei Sondirung stellt der Balken sich als Brücke heraus, welche über eine 12 Mm. tiefe Nasengrube zieht.

Wie ein Deckel liegt sich selber überlassen in Fig. I der mittlere Gesichtszipfel Z^2 darüber. In Fig. II ist dieser Zipfel zurückgeschlagen und überwölbt die viereckig klaffende Mundhöhle. Die beiden nahezu senkrecht gestellten Seitentheile der längs des Frenulum gespaltenen Oberlippe nehmen in Fig. II den Zipfel zwischen sich. In gerader Flucht des nach oben links verlaufenden rechten Theils der Oberlippe nimmt der Zipfel seinen Ursprung. Er ist dreikantig, an der Basis 12 Mm. breit und läuft in einen dünnen Faden aus; mit Einschluss dieses ist er 45 Mm. lang. An der Uebergangsstelle in den Faden zeigt er eine Längsfurche. Eine andere Furche läuft entlang der unteren Hälfte seiner vorderen Kante und setzt sich in einen bräunlich gefärbten Falz am Saume des rechten Oberlippentheiles fort. Dieser Falz scheidet, wie die gleichgefärbten Falze am linken Oberlippensaume und am Saume der regelrechten Unterlippe, äußere Haut und Lippen Schleimhaut. Eine Furche trägt auch der zwischen beiden

Seitentheilen der Oberlippe gelegene Theil der Zipfelbasis. Durch diese Basis wird die Verbindung zwischen mittlerem und linkem Gesichtszipfel hergestellt. — Der linke Zipfel Z^3 gleicht einem lang ausgezogenen, an der Spitze schief und rissig abgestutzten Schweinsohr, das 31 Mm. Länge und an der Basis eine grösste Breite von 11 Mm. hat. Bis zur halben Höhe ist dieser Zipfel mit seiner Rückenfläche an die Stirnhaut angewachsen. Seine rinnenförmige Innenfläche ist mit Ausnahme des Randtheiles von zarter Haut bekleidet und setzt sich gaumenwärts in eine von vorne her verdeckte, für eine feine Sonde 22 Mm. tiefe Höhle fort. Diese Höhle zeigt sich, soweit sie aufzudecken ist, gleichfalls von zarter Haut bedeckt.

In der weit klaffenden Mundhöhle sind ohne Weiteres die untere Gaumenfläche und der sie vorn wie seitlich überragende obere Zahnbogen sichtbar. Beide erweisen sich als nicht normal. Ein Gaumenspalat ist nicht vorhanden; wohl aber deutet eine furchenartige Vertiefung im medianen Theile des Gaumengewölbes auf unvollkommenen Schluss des Gaumens. Der obere Zahnbogen erscheint doppelt — in einen äusseren und inneren Wulst gegliedert, die durch eine Rinne von einander abgesetzt sind. Der Mediantheil des äusseren Wulstes trägt eine kaum 0,5 Mm. breite Papilla incisiva. Der innere Wulst zeigt im vorderen Theile jederseits fünf deutlich ausgeprägte, dicht gedrängte, crenelirte Gaumenleisten. Median von diesen tritt eine warzenartige Erhebung vor und hinter ihnen jederseits eine mehrhöckerige Vorrangung vom Aussehen eines grossen Zahnkeimes. Die mediane Warze misst an ihrer runden Basis im Durchmesser 1 Mm. und trägt an ihrer Spitze eine Oeffnung, aus welcher ein kaum 1 Mm. langer Zapfen vorragt.

Der untere Zahnbogen ist normal. Die der Gestalt und Grösse nach normalen Keime der vier Schneidezähne sind deutlich zu erkennen. Die wohlgestaltete Zunge reicht mit ihrer Spitze bis zu diesen Zahnanlagen.

Normal ist auch die äußere Gliederung der Ohren. Der Abplattung und oedematösen Wulstung des rechten Ohres entspricht, daß daselbe 5 Mm. länger als das linke ist und dem Kopfe dichter anliegt. — Die Spitzen beider Ohren liegen in gleicher Höhe und bilden die Enden der zwei Leitlinien, deren eine quer über den Schädel ziehend die fötale Ansatzlinie des Verwachsungsbandes einschließt, deren andere zum Zwecke der Gesichtstopographie in horizontaler Richtung gezogen ward.

Wie der Kopf des Kindes und die Schafhaut fallen **Hände und Füße** durch regelwidrige Fortsätze ins Auge.

Auch in Bezug auf Haltung wie Beweglichkeit erweisen Hände und Füße sich als regelwidrig. In der Vertheilung der Regelwidrigkeiten besteht beim Hand- wie Fuß-Paar unvollkommene Symmetrie.

Die rechte Hand stellt eine häufigere Form der Klump-hand dar. Von ihren Fingern sind zwei verkümmert und verkrümmt. Sie kehrt — in Fig. I in situ abgebildet — ihre Beugefläche rückwärts der rechten Achselhöhle zu. Zum Unterarme, der sich zwischen Pronation und Supination befindet, steht sie in volarer rechtwinkliger Beugung unter leichter Abweichung ulnarwärts. Im Uebrigen ist sie gestreckt, derart, — daß die Finger in einer Flucht geschlossen neben einander liegen. Im Handgelenke und im zweiten wie dritten Finger-Mittelhandgelenke läßt sie nur beschränkte, in den anderen Gelenken regelrechte Ausladungen zu.

Unter den fünf Fingern sind nur Daumen und kleiner Finger regelrecht. Der Ringfinger ist es bis auf einen zarten Schnürring, dessen Enden an der radialen Fingerseite liegen und hier seitlich auseinander weichen. Er ist der längste, mißt entlang der gestreckten Rückenseite 19 Mm.

Mittel- und Zeigefinger sind verkrüppelt, sind verkümmert und miteinander an den Grundphalangen in geringer Ausdehnung verwachsen.

Der längs der Rückenfeite 15 Mm. lange Mittelfinger besteht äußerlich aus drei durch Furchen von einander abgesetzten Gliedern, von denen nur das Nagelglied der inneren Fingergliederung entspricht. Das mittlere dieser Glieder ist das längste, ist von Tonnenform und birgt in seinem Innern das erste Phalangealgelenk. Das von ihm durch eine feichte Rückenfurche abgesetzte, 2 Mm. lange Nagelglied trägt auf seinem Rücken ein halbmondförmiges Nagelbett. Auf halber Rückenhöhe des ersten Gliedes zeigt der Mittelfinger einen siegelringähnlichen Hautwulst. Das der Siegelringplatte entsprechende breiteste Stück dieses Wulstes legt sich quer über den Fingerrücken. Der dem Ringbogen zukommende Antheil trägt an der Handbeugefeite zwei hirsekorngroße, rauhe, ockerfarbene Buckel, die um die Fingerbreite von einander abstehen. An der dem Zeigefinger zugewandten Seite ist der Hautwulst mit diesem so eng verschmolzen, daß eine ausgiebige Spreizung der beiden Finger nicht möglich wäre. An der Verschmelzungsstelle sieht man handrückenfeits einen den genannten Buckeln gleichen Fortsatz sich erheben.

Der 10 Mm. lange Zeigefinger ist der kleinste unter den Fingern. Ein tiefer Hautfalz, der mit dem Siegelring des Mittelfingers eine Achterschlinge herstellt, scheidet ihn in ein cylindrisches Wurzel- und ein kegelförmiges End-Stück, die gleiche Länge haben und in gelenkiger Verbindung stehen. Das Endstück wiederum wird nahe dem freien Ende durch zwei feichte quere Rillen abgetheilt, von denen die der Fingerspitze nähere Ringform hat, die andere als halber Ring dem Fingerrücken aufliegt. Eine innere Gliederung ist am Endstücke durch äußeres Untersuchen nicht erweisbar. Auch ein Nagel fehlt ihm.

Dem in Fig. I bei f' angedeuteten Falz des Zeigefingers ward bald nach der Ueberlieferung des Kindes ein fester röthlicher Faden entwunden, dessen mikroskopische Natur später Erörterung findet.

Die linke Hand stellt wie die rechte eine Klumphand dar, doch eine solche von feltenerer Form. Sie läßt äußerlich nur vier Finger unterscheiden, von denen überdies drei verkrüppelt sind. In Fig. III ist sie in natürlicher Gröfse, in der Ansicht von der Beugeseite dargestellt und in Verbindung mit dem Handstücke des supinirten Unterarmes. Dieser ist auch beim Kinde in situ supinirt, steht hier in steifer, höchster, nicht völlig ausgleichbarer Ellenbeugung. Zum Unterarme ist die Hand ulnarwärts so gebeugt, daß sie die Kleinfingerseite beinahe an die ulnare Seite des Unterarmes legt. Der Zeigefinger ist gestreckt. Der Daumen und die übrigen Finger sind eingeschlagen. Hand wie Finger waren in dieser Haltung zum Theil durch innere Steifigkeit, zum Theil durch äußere Strangverbindung festgehalten. Die Steifigkeit des Handgelenkes läßt in diesem nur geringe dorfale und volare, ausgiebiger ulnare, aber radiale Beugung überhaupt nicht zu.

Durchaus normal, sowohl was Form und Gröfse, als Beweglichkeit anlangt, ist nur der Zeigefinger. Die anderen Finger kennzeichnen sich von Vornherein dadurch als regelwidrig, daß ein Strangwerk zwischen ihnen ausgespannt ist.

Die auffallendste Mißgestaltung zeigt sich im Bereiche des Ring- und kleinen Fingers, indem dort wo diese für gewöhnlich der Mittelhand entwachsen ein einzelnes, kegelförmiges Gebilde sich erhebt. Diese Mißgestaltung scheint an eine Mißbildung der Mittelhand sich anzuschließen, indem hier an Stelle der zwei ulnaren Metacarpusknochen nur einer durch äußere Betastung zu ermitteln ist. Die Basis des kegelförmigen Gebildes mißt im größten, radioulnaren Durchmesser 1 Cm.; seine ulnare Seite mißt 17, die radiale 13 Mm. Länge. Mit der Mittelhand ist dieser Fingerkegel durch ein Gelenk verbunden, das ausgiebige Excursionen nur ulnarwärts zuläßt. In seinem Innern ist durch äußere Untersuchung nur ein einziges Gelenk erweisbar. Dieses Gelenk liegt der Kegelspitze nahe und zerlegt dadurch den Kegel in zwei ungleich große

Theile. Der kleinere Spitzen-Theil stellt ein 4 Mm. langes wohlgebildetes Nagelglied dar. Der klumpige, maffigere Grundtheil ist auf der Rückenseite von glatter Haut bedeckt; die Haut der Beugeseite zeigt eine Furche und zwei Erhebungen, welche Fig. IV in doppelter Gröfse wiedergiebt. Die Furche ist längsgerichtet und theilt die Beugefläche in zwei Hälften, auf deren dem Mittelfinger benachbarten die Erhebungen sich befinden. Die Ursprungsstellen letzterer liegen in einer Flucht und parallel der Furche. Die dem Nagelgliede nähere Erhebung X gleicht einem 5 Mm. langen, 1 Mm. dicken, biegsamen, cylindrischen Zapfen, der in zwei Glieder geknickt ist. Auf dessen 3 Mm. lange, fast 1 Mm. breite Basis setzt, den Zapfen bis zur Spitze bekleidend, die Fingerhaut sich fort. An dieser Spitze ist bei Lupenuntersuchung ein Buckel wahrzunehmen, dessen Natur — ob die eines Nagels — einer mikroskopischen Prüfung zu ermitteln bleibt. Die andere, der Kegelbasis zunächst gelegene Erhebung gleicht einem an längster Stelle etwa 3 Mm. langen Hautsprofs. Aus der dem Daumen und Mittelfinger zugewandten Spitze dieses Sprofses entspringen mit 1 Mm. langem und ebenso breitem gemeinsamen Stamme zwei Fadengebilde. Das eine dieser Gebilde stellt eine in gestrecktem Zustande 12 Mm. lange, freidendigende zarte Ranke R dar, die nahe ihrer Ursprungsstelle eine etwa 1 Mm. weite Oese birgt. Der andere Faden ist Bestandtheil des schon erwähnten Strangwerkes D, das sich zwischen dem Fingerkegel, Mittelfinger und Daumen ausspannt. Die Art, wie dieses Strangwerk die regelwidrige Stellung der drei Finger bestimmt, die Beweglichkeit derselben beschränkt, erinnert an die Strangbildung, welche bei der als «Permanente Beugung» bezeichneten Handverkrümmung vorkommt. Im Zusammenhange mit dem Strangwerk gleichen die drei Finger einem Dreifufs. Das Strangwerk selbst gleicht einem Draht-triangel, wie es der Chemiker zur Stützung von Kochgeschirren über Dreifüsse zu legen pflegt. Es stellt ein gleich-

schenkliges, an den Spitzen in kurze Spangen ausgezogenes zartes Fadendreieck dar, das sich mit diesen Spangen an kurze Hautsprosse der Beugeseiten der drei Finger ansetzt. Die 4 Mm. lange Basis dieses Dreiecks wird von dem Faden hergestellt, der zwischen kleinem und mittlerem Finger gespannt ist; die beiden je 3 Mm. langen Schenkel stellen die Verbindung des Daumens mit dem kleinen und mittleren Finger her. Alle Fäden sind ockerfarben, durchscheinend, sind biegsam und so gut wie unausdehnbar.

Der Mittelfinger ist nächst dem vierten und fünften Finger am Aergsten mißgebildet. Zufolge der besprochenen Strangverbindung ist er im Fingermittelhandgelenke permanent gebeugt. Ungefähr 4 Mm. von diesem Gelenk entfernt umgiebt ihn eine Furche, welche auf der Rückenseite leicht ist, an der Beugeseite sich vertieft und hier die eine Ansatzstelle des Fadendreiecks birgt. Diese Furche scheidet den Mittelfinger in ein kürzeres äußerlich wohlgebildetes Wurzel-Stück und in ein End-Stück, das einem in der Mitte angeschwollenen, 9 Mm. langen, an dickster Stelle 5 Mm. breiten Zapfen gleicht. Eine der Spitze nahe, an der Beugeseite gelegene Furche, welcher im Zapfeninnern ein Gelenk zu entsprechen scheint, scheidet diesen Zapfen wiederum in zwei ungleich große Stücke. Das kleinere derselben giebt sich durch seine Lage am äußersten Fingerende, seine Kleinheit und die warzenartige Andeutung eines Nagelbettes als verkümmertes Nagelglied zu erkennen.

Auch der in die Hohlhand fast auf's Aeufserste eingeschlagene Daumen ist durch die angegebene Verbindung permanent gebeugt. Er ist es in allen Gelenken, da das Fadenwerk an der Beugeseite seines Endgliedes haftet. Dieses Endglied ist verkümmert und zur Grundphalanx nach der lateralen Seite des Daumenballens stumpfwinkelig gebeugt. Ein rings von einem Hautwalle umzogener, am vorderen Rande zugestutzter Nagel kennzeichnet es als Nagelglied. Von der Grundphalanx wird das Nagelglied äußerlich durch

eine feichte, in Fig. III durch f^2 bezeichnete Ringfurche geschieden.

Dieser Furche ward wie der Zeigefingerfurche der rechten Hand ein fester röthlicher Faden entwunden, welcher an der Beugeseite des Nagelgliedes, dort wo das Fadendreieck haftet, mit der Epidermis zusammenhing.

Keiner der zwei entwundenen Fäden erreicht 1 Cm. Länge; ihre grösste Breite beträgt 2 Mm. Der eine trägt eine Anzahl traubiger Sprossen und eine zarte Fadenranke. Der andere gleicht einem einfachen, gedrehten Faden. Welcher von ihnen dem rechten Zeigefinger, welcher dem linken Daumen angehörte, ward bei der Entnahme der Fäden nicht beachtet.

Gleich den Händen verrathen die Füfse ohne Weiteres Klumpnatur. Die Einfachheit ihrer Mifsgealtung macht Abbildungen überflüssig.

Der linke Fuß ist kürzer, schmaler und ungealter als der rechte. Er stellt einen nicht völlig ausgleichbaren Pes equinovarus mittleren Grades dar. Die drei ersten Zehen sind verkümmert. Der linke Unterschenkel ist verschmächtigt. Die Ferse ist gehoben, die Fußspitze gefenkt; — zugleich sind beide so einwärts gewandt, dafs die Sohle stark ausgehöhlt, von einer tiefen Querfurche durchzogen ist und der Fußrücken mit auswärts convexem, ununterbrochenem Bogen in die fibulare Seite des Unterschenkels übergeht.

Die verkümmerten drei ersten Zehen stellen gemeinsam einen Ballen dar. Die vierte und fünfte Zehe sind wohlgeschieden, gegen die Sohle nach Krallenart gebogen und tragen an normaler Stelle je einen von der Haut falzartig rings abgesetzten Nagel.

Grofse, zweite und dritte Zehe sind an dem erwähnten Ballen von der Rückenseite her gefondert; auf der Sohlenseite ist der Ballen ungetheilt. Nur die dritte Zehe ist am Ballen als solche zu erkennen. Sie ist gleichwohl so sehr verkümmert, dafs ihr freies Ende kaum die Sohle überragt. Die

Nagelanlage fehlt ihr auch bei Lupenuntersuchung. Die Trennung der dritten Zehe vom übrigen, größeren Ballentheile wird durch eine Rinne hergestellt; die Verbindung mit demselben durch eine schmalste Hautverwachsung, welche sich als Brücke derart über jene Rinne hinspannt, daß eine feine Borste unter ihr Durchgang finden kann. Hinter dieser Brücke liegt ein 1 Mm. breiter rundlicher Haut Hügel, der zusammen mit einem hinterwärts gelegenen schmalen Hautwall die Anlage der zweiten Zehe darstellt. Die große Zehe bildet weitaus den mächtigsten Theil des Ballens. Sie ist ein ungegliederter, von Haut glatt überzogener, im Innern einen festen Kern beherbergender Stumpf, in welchem seitlich von der ihn mit der dritten Zehe vereinigenden Brücke ein 1 Mm. breiter und ebenso langer Faden wurzelt. Dieser Faden giebt drei Zweige ab, welche die gleiche Natur wie das Fadenwerk der linken Hand verrathen und deren längster 4 Mm. lang ist.

Der rechte Fuß entbehrt des größten Theils der großen Zehe. Er ist durch seine Pronation, die Abflachung des Rückens, die polsterartige Vorwölbung der Sohle, das starke Hervorspringen des inneren, das Verstrichenfein des äußeren Knöchels und die starke Auswärtswendung der Fußspitze als *Pes valgus* mittleren Grades kenntlich. Die Ausgleichung der Fußverkrümmung gelingt nur unvollständig.

Die vier äußeren Zehen sind stark auswärts gewandt. Sie sind es um so mehr, je näher sie dem äußeren Fußrand liegen. In derselben Reihenfolge nimmt ihre krallenartige Krümmung zu, kommt ihre Rückenseite mehr auf die Unterseite des Fußes zu liegen und werden die Nagelanlagen unbestimmter. Die zweite Zehe trägt am ersten Gliede auf dem Rücken und der der großen Zehe zugewandten Seite eine feichte Furche, an welche eine Rückenfurche der dritten Zehe anschließt.

Von der großen Zehe ist nur ein Stumpf erhalten. Derselbe ist von glatter Haut bedeckt, die an der tibialen Seite

des Ballens fest an dem harten Kern des Stumpfes haftet, im Uebrigen frei verschiebbar ist.

Die weitere Beschaffenheit des Kernes wird durch die innere Untersuchung des Kindes, die mit dem Hirnschädel anfängt, festgestellt.

Innere Untersuchung.

Ein von der Mitte des Scheitels ausgehender, das Schädeldach durchtrennender Kreuzschnitt legt das **Innere des Hirnschädels** frei. Der Schnitt schont das zwischen Mutterkuchen und dem Kindskopfe befindliche Verwachungsband, läßt es im Zusammenhange mit dem rechten hinteren der durch ihn gebildeten vier Schädellappen.

Bei der Eröffnung quollen aus dem Schädelraume etwa zwei Eßlöffelvoll einer gelben, an weißlichen Flocken reichen, breiigen Flüssigkeit hervor. Die Flocken erwiesen sich bei mikroskopischer Untersuchung durch ihr dichtes Capillarnetz und den Zellenreichthum als Trümmer grauer Hirnmasse. Die sie umgebende Flüssigkeit enthielt in Menge Fetttropfen Myelingeilde und Neurogliaelemente, in geringerer Zahl Cholesterin- und Margarin-Krystalle, vereinzelt Kreatinkrystalle. Stellenweise bot die Flüssigkeit bei starker Vergrößerung das Aussehen einer Emulsion, indem in schleimartiger, gelber Grundmasse feinste Fettkügelchen kettenförmig aneinander lagen. Ob jene gelbe Färbung aufgelöstem Blutfarbstoffe entstammte, war durch die Teichmann'sche Probe nicht ermittelbar.

Der gewonnene Einblick in die Schädelhöhle erweist eine noch größere Asymmetrie der beiden Schädelhälften, als die äußere Untersuchung darthat. Die linke Hirnhemisphäre ist etwa um ein Drittel kleiner als die rechte. Die Großhirnsichel ist stark nach links verrückt; sie entspringt als fadenförmiges, im Allgemeinen 12 Mm. breites Band längs einer Linie, die vom linken Ansatzende des mittleren Gesichts-

zipfels, entlang dem in Fig. I am Scheitel sichtbaren hellen Strange g zur Mitte des Hinterhauptes zieht.

Bei Eröffnung des Schädeldaches trat unter der dabei zum Theil durchtrennten Pia mater das Gehirn mit scharf ausgeprägten, derb anzufühlenden Windungen hervor. Die Pia umschloß das Hirn als zarte, nirgends regelwidrig anhaftende Haut. — Obschon es vor Einwirkung des wässerigen Weingeistes möglichst gehütet wurde, erwies sich das Gehirn drei Tage nach Eröffnung des Schädeldaches bei der Herausnahme zum gröfseren Theil in einen weichen Brei verwandelt; der Bafaltheil der rechten Hemisphäre sowie das Kleinhirn waren zu einer Milch verflüssigt. Eine regelrechte Zerlegung des Gehirnes ward dadurch unmöglich. Nirgends fanden sich Trübungen der Hirnhäute, die genöthigt hätten, Brei oder Flüssigkeit als zum Theil entzündliche Producte aufzufassen. Auch im Verlaufe der an der Schädelbasis nach Lostrennung des Hirnes haftenden Hirnnerven war kein Exsudat — selbst nicht bei Lupenuntersuchung — nachzuweisen. An der Hirnoberfläche fielen in den hinteren Theilen beider Hinter-, den vorderen Theilen beider Vorder-Lappen in beiderseits nahezu gleicher Ausdehnung eine Anzahl dichtgedrängter, roftbrauner Flecken von Hanfkorn- bis Kirschkern-Gröfse auf.

Nach Entfernung des Gehirnes ward die von harter Hirnhaut ausgekleidete, zum gröfseren Theile knöcherne Schädelbasis sichtbar. Dieselbe, im hinteren Abschnitte nach hinten links verzerrt, zeigt einen erheblich geringeren Umfang der linken Hälften der drei Schädelgruben. — Ueber die hintere, theils knorpelige, theils knöcherne Schädelgrube spannt sich in regelwidriger Weise das Tentorium. Ein vom Türkenfattel zur Eminentia cruciata am Hinterhauptbein ziehender, 15 Mm. breiter Spalt zerlegt es in zwei ungleich breite, 34 Mm. lange Schenkel. Der linke Schenkel zieht als kaum 2 Mm. breites weißes Band vom linken vorderen Processus clinoides zum inneren Hinterhauptshöcker, hier in die Großhirnfichel über-

gehend; eine Kleinhirnfichel fehlt. Der rechte Schenkel, eine durchscheinende weißliche Membran, gleicht einer in der Mitte 1 Cm. breiten Mondfichel. Sein freier innerer Rand verbindet den vorderen rechten Sattelhöcker mit einem von der inneren *Protuberantia occipitalis* 15 Mm. nach rechts gelegenen Punkte. Die Mitte dieses Randes kreuzt von unten her ein dem Warzentheile des rechten Schläfenbeins entspringender linsengroßer, an seiner Vorderfläche die *Fossa sigmoidea* bergender Knochenhöcker. Ein gleicher Knochenhöcker erhebt sich diesem quer gegenüber oberhalb des linken Tentoriumblattes vom linken Warzenbeine. Durch die Spalte des Tentorium gewahrt man das herzförmige, 13 Mm. breite, 18 Mm. lange, mit der Spitze nach hinten links gewandte Hinterhauptloch und jederseits vier kleine Lücken, durch welche in regelrechter Reihenfolge der V., der VII., VIII., der IX., X., XI. und der XII. Hirnnerv treten. Das VI. Nervenpaar verläßt unter der *Dura mater* die hintere Schädelgrube. Nach Ablösung der *Dura* wird das der Form wie Gliederung nach regelwidrige Hinterhauptbein sichtbar. Seine Schuppe ist mit den Gelenktheilen durch einen quer hinter dem *Foramen magnum* laufenden, 5 Mm. breiten Knorpelstreif verbunden. Dieser Knorpelstreif trägt jederseits zwei Ausläufer, deren vorderer das Scheitelbein vom Warzenthail des Felsenbeines, deren hinterer daselbe von der Schuppe des Hinterhauptbeins scheidet. Der äußeren Form nach gleicht die Hinterhauptschuppe einem aufgespannten Fächer, dessen convexer Bogenrand dem Basalthteile des Hinterhauptbeins und den Scheitelbeinen zugewandt ist, während die zwei die Fächerbasis bildenden, leicht concaven Schenkel 18 Mm. hinter der Bogenmitte sich unter stumpfem Winkel treffen. Eine vom Scheitel dieses Winkels zum rechten Rande des *Foramen magnum* ziehende Knochennaht zerlegt die Schuppe in zwei ungleich große Stücke. Das links gelegene Hauptstück hat festes, fast undurchsichtiges Gefüge. Das rechte Nebestück ist wie die

Belegknochen des Schädeldaches biegsam und in strahliger Structur durchscheinend. — Die mittlere durchweg knöcherige Schädelgrube zerfällt durch die vorderen Abschnitte der Tentoriumblätter in einen symmetrischen medianen und zwei ungleich große Seitentheile. In der Mitte des Mediantheils liegt die Hypophysis, an jeder Seite treten ein II., III., IV. Hirnnerv aus. Eine 3 Mm. dicke Knorpelfuge scheidet den Mediantheil dieser Grube vom Hinterhauptbein. — In der vorderen Schädelgrube ist der Ethmoidaltheil knorpelig; die Orbitaltheile, deren rechter der größere ist, sind häutig. In der Mitte des Ethmoidaltheils erhebt sich der knorpelige, 5 Mm. hohe, 4 Mm. lange Hahnenkamm, der sich nach vorn in zwei ebenso lange Leisten, die Seitenwände des Foramen coecum gabelt. Zu beiden Seiten des Hahnenkammes liegen die unebenmäßigen Siebplatten. Die linke stellt mit dem linken Orbitadache eine ebene Fläche dar und wird im medialen Theile vom linken Riechkolben bedeckt. Die rechte Siebplatte wird durch die vordere basale, 1 Cm. lange Ansatzlinie der Großhirnfichel in zwei Felder abgetheilt. Das mediale Feld liegt frei zu Tage; das laterale trägt den rechten Bulbus olfactorius und wird vom rechten mit ihm im Niveau gelegenen ebenen Orbitadache durch eine 13 Mm. lange, durchschnittlich 1 Mm. hohe, theils häutige, theils knorpelige Leiste abgesetzt. Nach Entfernung der Riechkolben, von denen der linke weiter vorwärts reicht, zeigen sich die Sieblöcher; die linkerseits gelegenen sind reichlicher und mächtiger entwickelt als die rechten.

Auch am Schädeldach erweist die innere Untersuchung im Allgemeinen geringere Ausbildung der linken Schädelhälfte. Sowohl die Cutis, als der mit ihr straff verbundene Epicranius, als das Perioft und ein an dessen Innenseite haftendes, aus Belegknochen, Primordialcranium und Dura mater in wechselndem Maasse zusammengesetztes Blatt sind linkerseits schwächer als rechts. Die bei der äußeren Untersuchung gefundenen Hautunterbrechungen, Hervorragungen, Knochenlücken sowie

das Verwachungsband zwischen Schädeldach und Mutterkuchen bedingen theilweis diese wechselnde Zusammensetzung.

Das Verwachungsband wird mit der Scheere in seinem freien Theile quer durchschnitten. Die so gewonnenen, in frontaler, längster Ausdehnung 16 Mm. messenden Schnittflächen sind von Dreiecksform. Die linkerseits gelegenen, am linken Rande 6 Mm. breiten Basalabschnitte beider Dreiecke stimmen völlig überein; sie werden von cavernösem, rothbraunem, placentaähnlichem Gewebe hergestellt. Die rechtsseitigen Spitzentheile sind verschieden. Der Spitzenthail der fötalen Schnittfläche stellt einen schmalen, gelblich weissen, rein amniotisch scheinenden Streifen dar. Der Spitzenthail der placentaren Schnittfläche besteht aus zweien solchen Streifen; dieselben schliessen einen Spalt ein, welcher placentawärts in eine schon beschriebene taschenartige Höhlung des Verwachungsbandes führt.

In den vorderen dieser Streifen gingen vor Durchschneidung des Verwachungsbandes die Ränder des in der Scheitelgegend klaffenden Cutisfaltes über. Nach Aneinanderlegen dieser Ränder stellte die Tasche des Verwachungsbandes die aufwärtige Fortsetzung einer flachen Höhle dar, die von Schädelcutis und der in der Scheitelgegend zu Tage liegenden Membran umschlossen ward. Diese Membran erweist sich als ein aus Primordialcranium und Dura Mater untrennbar zusammengesetztes Blatt. Die mediane strangartige Verdichtung der Membran bezeichnet den Ursprung der Großhirnfichel und den Verlauf des Sinus falciformis maior; letzterer reicht rückwärts bis zum Hinterhauptshöcker, nach vorn kaum über die vordere Grenze des Cutisfaltes.

Die hinter dem Verwachungsband gelegene Cutislücke wird von einer Doppelhaut geschlossen, welche durch Verwachsung einer amniotischen Fortsetzung des Verwachungsbandes und einer Fortsetzung der Dura-Primordial-Membran gebildet wird.

Die innere Untersuchung der dritten, in der rechten

Stirngegend gelegenen Cutisunterbrechung fällt der Unterfuchung des Inneren des Gesichtschädels anheim.

Von den drei Hervorragungen barg die in der rechten Scheitelgegend liegende einen Theil der bei Eröffnung des Schädels ausgetretenen Flüssigkeit. Im medialen Theile wird diese Vorrangung nur von der Dura-Primordial-Membran, im lateralen auch vom Epicranium und der äußeren Haut umschlossen; lateralwärts wird sie von einer Einkerbung des rechten Scheitelbeins, in welches die Membran ununterbrochen übergeht, begrenzt.

Die in der rechten Stirn- und linken Hinterhaupts-Gegend gelegenen Erhebungen waren bei der Eröffnung des Schädelraumes von Hirnabschnitten ausgefüllt. Die Bedeckungen beider setzen sich aus Cutis, Epicranium und Dura-Primordial-Membran zusammen. Am basalen Rande der Hinterhaupts-erhebung sind diese Schichten eng verwachsen. Diese Basis hat Dreiecksform. Die hintere Dreiecksseite wird von einer Einkerbung des Hinterhauptbeins hergestellt; entlang derselben geht die Dura-Primordial-Membran unter Bildung einer 4 Mm. tiefen Ausfackung in das Hinterhauptbein über. Die beiden anderen Seiten gehören häutigen Schädeltheilen an. Die mediale Seite grenzt an die linke Kante des hinteren Schädelhautdefectes; die vordere frontal gestellte Seite liegt in der Verlängerung von dessen vorderen Grenze. — Die Hervorragung der rechten Stirnseite hat eine myrtenblattförmige Basis. An deren lateralem, von der vorderen Kante des rechten Scheitelbeins gebildeten Rande geht die Dura-Primordial-Membran in Knochen über, während sie am medialen Rande mit der die Stirnhautunterbrechung ausfüllenden Schwarte häutig verbunden ist.

Die Knochenlücken erstrecken sich über ein größeres Gebiet, als Hautdefecte und Hervorragungen. Die innere Unterfuchung weist die Knochenlücken zum Theil anderen Schädelgegenden zu, als die äußere Betastung darthat. Die Stirnspange,

welche als knöcherner Vertreter des linken Stirnbeines aufgefaßt ward, erweist sich durch die Nahtverbindung mit der rechten Siebbeinplatte und durch den Ansatz der Großhirnichel längs des linken Spangenrandes als rechter Stirnbeinknochen. Das linke Stirnbein ist durch ein 1 Cm. breites, in sagittaler Richtung 5 Mm. messendes Knochenblatt vertreten, welches, mit der rechten Stirnbeinspange durch eine häutige Lamelle verbunden, rückwärts an die linke horizontale Siebbeinplatte gränzt, vorn und aufwärts in das Dura-Primordial-Blatt übergeht. Nächst den Stirnbeinen ist das linke Scheitelbein am Unvollständigsten entwickelt. Dasselbe stellt eine elliptische leicht auswärtsgewölbte, in sagittaler Richtung 27 Mm., in frontaler 18 Mm. messende Knochenplatte dar; es steht in beweglicher Nahtverbindung mit der Hinterhaupts- und linken Schläfen-Schuppe. Nahezu normal ist nur das rechte Scheitelbein. Dasselbe liegt gleich den übrigen Schädeldachknochen in Dura-Primordial-Haut eingeschlossen.

Das **Innere des Gesichtschädels** führt auf diese Haut von Neuem. Sie ersetzt hier die fehlenden Stirnbeintheile beider Orbitae und liefert das Innenblatt der Schwarte, welche die dreieckige Unterbrechung in der rechten Stirnhaut ausfüllt. Die Ablösung dieses Blattes von der übrigen aus Epicranium und Schleimhaut untrennbar zusammengesetzten Schwarte gelingt nur bis zur Ursprungsstelle des in Fig. I und II durch Z' bezeichneten Stirnzapfens. Die Epicranium-Schleimhaut-Schicht ist derb, zeigt eine faserige, von der Basis des Stirnzapfens ausgehende Strahlung und auf röthlicher Innenfläche eine Anzahl rothbrauner, Erbsengröße erreichender Petechien. Das Dura-Primordial-Blatt ist mit braunrother Farbe durchscheinend; es geht ununterbrochen in das häutige Dach der rechten Augenhöhle über.

Die Knochen wie die Muskeln sind auf der rechten Seite des Gesichtschädels mächtiger als links. Die beiden Nasenbeine fehlen.

Die Augenhöhlen unterscheiden sich durch die Gröfse und die Lagerung ihres Inhalts. Ihrer Form nach gleichen sie dreieitigen Pyramiden, deren Grundflächen nach vorn gewandt sind; nur die temporalen und nasalen Wandungen sind knöchern. — Die rechte Orbita ist die geräumigere. Ihrer abnormen Breite entspricht die ungewöhnliche, aus Fig. I ersichtliche Länge des rechten unteren Lidrandes. Ihre obere Grenze wird durch die beiden queren, die Stirnswarte in Fig. I wie II durchziehenden Furchen äusserlich, bezeichnet. Längs diesen Furchen haften am Innenblatt der Swarte der Levator palpebrae und der obere vordere Rand der Capsula Tenoni. Unter dem Levator, in die temporale Hälfte der Orbita gedrängt, liegen der rechte Bulbus und der an dessen Hinterwand eintretende, vom Foramen opticum an 18 Mm. messende Sehnerv. Die nasale, nach vorn von einem Theil der Swarte abgegrenzte Orbitahälfte wird zum gröfseren Theile von Fettgewebe ausgefüllt. Von den am Bulbus haftenden sechs Augenmuskeln ist der Rectus internus der mächtigste. Er ist mit dem Muskelbauche des oberen Obliquus eng — jedoch trennbar — verbunden; einige seiner Bündel gehen mit gefonderten Sehnen in das nasale Blatt des Orbita-Perioestes über. Im Inneren des Bulbus findet sich ein schwarzer Brei, aus welchem sich eine röthliche, breiige Kapfel und eine zapfenförmige Linse sondern lassen. Letztere zeigt an der Basis einen Dreistern, in dessen Spitzen die einen zweiten Dreistern bildenden Seitenkanten des Zapfens übergehen. Die Linsenmasse ist undurchsichtig, röthlich-gelb und undeutlich geschichtet. — In der linken normale Gröfse bietenden Augenhöhle gelingt die Scheidung von Rectus internus und oberem Obliquus überhaupt nicht; die Bulbussehne des Obliquus ist so wenig wie seine Trochlea zu finden. Die Lagerung des übrigen Augenhöhleninhalts ist normal. Der linke Bulbus wird im Innern von dem durch eine Pupillarmembran geschlossenen Uvealtractus bekleidet. Er birgt in schwarzer, breiiger Masse

eine der Form wie Anordnung der Sterne nach normale Linse. In Farbe, Undurchsichtigkeit und Schichtung stimmt diese Linse mit der des rechten Auges überein. Der linke Sehnerv ist in seinem Orbitaverlaufe 2 Mm. kürzer als der rechte.

Die Lage der Nasenhöhlen ist eine andere als Fig. I und II vermuthen lassen. Sie liegen zu beiden Seiten einer Scheidewand, welche vom Keilbeinkörper vorwärts ziehend links von den beiden in Fig. II entblößten Gefichtsöffnungen endet. Diese Oeffnungen führen zum rechten Nasenraume. Das zum linken führende Nasenloch liegt im Grunde des linken Gefichtszipfels. Dem Inhalte wie der Form und Gröfse nach stimmen beide Nasenräume überein. Sie stellen trichterartige von Schleimhaut ausgekleidete Höhlen dar, welche 15 Mm. vom vorderen Zugange entfernt an der Vorderseite des Keilbeinkörpers ohne Choanenbildung endigen. Die seitlichen und unteren Höhlenwandungen sind knöchern. Von ihnen aus ragt in das Innere jedes Nasenraumes ein muschelartiges, in sagittaler Richtung 13 Mm. messendes knorpliges Gebilde. Auffallend ist die Nasenscheidewand. Sie hat 4 Mm. Dicke und wird von den knöchernen Innenwänden beider Nasenräume und einem dazwischen liegenden knorpligen, von derber, weißer Haut umhüllten, 2 Mm. dicken Fortsatz des Keilbeinkörpers hergestellt. Hahnenkamm und vertikale Siebeinplatte gehören diesem Fortsatz an. Den unteren Rand deselben umgreift der knöcherne Gaumen. Dieser stellt eine 6 Mm. dicke, rückwärts in das Keilbein übergehende, in der Medianlinie geschlossene Knochenplatte dar. Dieselbe schließt die Nasenhöhlen vom Munde und Rachenraume ab. An der unteren Fläche dieser Knochenplatte entspringt 17 Mm. vom vorderen Alveolarrande entfernt das in ein Zäpfchen auslaufende, mit seinem mittleren Theile an der Schädelbasis angewachsene Velum.

Mund- wie Rachen-Höhle zeigen sich nach Median-spaltung der Schädelbasis nach hinten links verzerrt. Am

Auffallendsten ist die Verzerrung im unteren Rachenabschnitt, dessen Speiseröhrenöffnung nach links verrückt ist, während rechts davon sich eine muldenförmige Ausbuchtung der Rachen Schleimhaut findet. Die Asymmetrie des oberen Rachenabschnitts wird an den seitlich vom Zäpfchen liegenden Tubenöffnungen sowie an zwei Schleimhautgruben sichtbar, die zwischen Schädelbasis und dem Velum, Rachennasengängen ähnlich, auf die Nasenhöhlen zuziehen. Das linke Tuben- und das rechte Gruben-Ostium zeigen elliptische Form und knorpelige Umwallung; die linke Gruben- und die rechte Tuben-Mündung liegen schlitzartig im Niveau der Rachen Schleimhaut. Die Gruben bieten 7, die Tuben 14 Mm. Tiefe. — Die auffälligste Bildung zeigt das Schlundgewölbe. Seine Schleimhaut bildet eine Erhebung, welche vom Türkenfattel aus sondierbar und mit hypophysisartiger Masse angefüllt ist; sie hat ErbsegröÙe und ist an der Spitze mit einem fleischigen Knopf versehen. Durchaus normale Bildung zeigt der Kehlkopf. Bei feiner Freilegung durch einen medianen Hautschnitt werden nirgends Sugillationen im Halsgewebe sichtbar.

Die Verlängerung dieses Schnittes legt den Rippenkorb und den Inhalt des Abdomen frei.

Weder durch Beschaffenheit noch Lagerung fällt das **Innere des Abdomen** auf. In breiter Bauchfellfalte schlägt sich vom Nabel aus die Nabelvene zur linken Leberfurche, hier in den Ductus Arantii und einen zur Vena portae ziehenden Zweig zerfallend. Beckenwärts vom Nabel verlaufen die Nabelarterien vom Urachus begleitet. Nur Ileum und Dickdarm sind mit Meconium gefüllt; die oberen Darmabschnitte sowie der Magen bergen auf blasser Schleimhaut spärliche Massen gelben Schleimes. Die Nieren sind frei von Harnsäureinfarkten. Die Vagina zeigt erhebliche Weite, zottige Schleimhaut und bröckligen weissen Inhalt. Die Milz ist am convexen, dem Zwerchfell zugekehrten Rand gelappt.

Als flaches Gewölbe spannt sich das Zwerchfell zwischen

Brustraum und Abdomen aus. Seine Kuppe reicht bis zu den fünften Rippenräumen.

Das **Innere des Brustraumes** wird nach Entfernung des vorderen Rippenkorbes sichtbar. Es kommen die Thymus, die vorderen Lungentheile und ein dukatengroßer Theil des Herzbeutels zum Vorschein. Die Lungen bestehen im Zusammenhange mit dem Herzen im Wasser die Schwimmprobe; ebenso schwimmen die für sich allein geprüften Lungen und kleinere Lungenstücke. Sowohl beim Zusammendrücken der letzteren unter Wasser als beim Bestreichen ihrer Schnittflächen mit dem Messer tritt Schaum zu Tage. Dabei wird an keiner Stelle abnormer Lungeninhalt sichtbar. Die Lungenpleurae sind normal, Petechien nicht zu finden. Bronchial- und Tracheal-Schleimhaut sind stark geröthet. Der Herzbeutel birgt Spuren einer braunrothen, trüben, das rauhe Epicardium bedeckenden Flüssigkeit. Der Herzmuskel ist linkerseits mächtiger als rechts. Die Herzkammern enthalten geringe, die Vorhöfe reichlichere Mengen geronnenen Blutes. Foramen ovale und Ductus Botalli stehen weit offen.

Entscheidender als die Weite dieser Blutbahnen ist für das Alter der Frucht das Fehlen von Knochenkernen in den Condylen beider Oberschenkel.

Im Uebrigen beschränkt die **innere Untersuchung der Glieder** sich auf die Zergliederung des Hand- und Fufs-Paares.

Der linke Fufs birgt in dem Ballen, welcher — wie die äußere Untersuchung lehrte — die drei ersten Zehen einschließt, vier Phalangen; zwei derselben gehören der dritten, je eine der ersten und zweiten Zehe an. Die Phalanx der ersten und die der zweiten Zehe sind verkümmert. Das von der Vorderseite des Ballens vorragende Fadenwerk wurzelt in derbem, faferigem, die verkümmerte Phalanx der zweiten Zehe umhüllendem Gewebe.

Ein Gewebe von gleicher Faferung und Derbheit birgt der rechte Fufs im Stumpfe der großen Zehe. Den festen

Kern des Stumpfes stellt eine verkümmerte mit einem Knochenkern versehene Phalanx dar.

Die linke Hand erfährt eingehendere Zerlegung. Ihr theils knorpeliges, theils knöchernes Gerüst ist entsprechend der äusseren Handform ulnarwärts verkrümmt. An dieser Krümmung nehmen die Ulna durch starkes Zurückweichen, der Radius durch starkes Hervortreten ihrer unteren Enden Theil. Die Handwurzel gleicht einem knorpeligen Keile, dessen der ulnaren Seite zugewandter schmaler Theil durch die *Cartilago pisiformis* und die verjüngten *Cartilagines triquetra* und *hamata*, dessen Grundtheil durch die fünf anderen Wurzelknorpel hergestellt wird. Die Mittelhand weist, wie schon die äussere Untersuchung darthat, nur vier Knochen auf. Dieselben sind wohlgestaltet, sind gleichgrös und mit der Handwurzel derart verbunden, daß der vierte Metacarpusknochen mit dem Haken- und Kopf-Knorpel, die drei anderen mit dem letztgenannten, dem kleinen und dem grossen Viereck-Knorpel in bekannter Reihenfolge in *Amphiarthrosis* stehen. An die Knochen der Mittelhand schliessen gelenkig vier Phalangenreihen an. Die dem Daumen, Zeigefinger und ulnaren Fingerkegel angehörigen Phalangen sind der Zahl wie Form nach regelrecht; die beiden im Mittelfinger sich findenden Phalangen sind verkümmert. Der ulnare Fingerkegel birgt entgegen der äusseren Beschreibung drei Phalangen; dieselben liegen in einer Flucht und schliessen mit dem zugehörigen Metacarpusknochen einen spitzen, nach der ulnaren Seite offenen Winkel ein. Der Versuch, die Muskelmasse, welche den Fingerkegel und dessen Metacarpus einhüllt, in einzelne Muskeln zu zerlegen, ist erfolglos. Weder der dem Fingerkegel entspringende cylindrische Zapfen noch das zwischen Kegel, Daumen und Mittelfinger gespannte Fadendreieck stehen mit einem der Phalanxknorpel in Verbindung. Eine mit einer der Fingerhautfurchen zusammenhängende Phalanxfurche ist nur an der Grundphalanx des Mittelfingers aufzufinden,

Auch die rechte Hand bietet unter einer Anzahl Hautfurchen nur eine, von welcher die Zergliederung das Uebergreifen auf einen Phalanxknorpel feststellt. Diese Furche gestaltet den ersten Gliedknorpel des Zeigefingers zu einem kegelförmigen Gebilde und trennt von seiner Spitze eine verkümmerte zweite Phalanx. Für Ring- und Mittel-Finger bestätigt die Zergliederung den äußeren Befund.

Die Fäden, welche dem rechten Zeigefinger und dem linken Daumen entwunden wurden, werden gleich dem zapfenförmigen Anhang des linken Fingerkegels mikroskopisch untersucht.

Mikroskopische Untersuchung.

Nur vom Zapfen des linken Fingerkegels ist ein verständliches Bild gewinnbar. Von den Fäden ist der eine wegen verwickelter Gliederung, der andere zufolge unvollkommener Erhaltung nicht in allen Theilen deutbar.

Der Zapfen ward längs seiner Ansatzstelle am Fingerkegel abgeschnitten, mit Boraxcarminlösung durchfärbt, in Paraffin gebettet und von der Seite des in Frage stehenden Nagels in Längsschnitte zerlegt. Aus den Bildern dieser Schnitte reconstruirt stellt sich der Zapfen als ein cylindrisches, in zwei Glieder geknicktes Hautgebilde dar. Mit Ausnahme der Ansatzfläche wird er von Epidermis überzogen. Sein Inneres durchzieht ein Strang von fibrillärem Bindegewebe, der an der Zapfenbasis abgeschnitten endigt und in seinem Axentheile einen Spaltraum, an der Außenfläche einige Gefäße aufweist. Vom Rete Malpighi aus ziehen diesem Strange in bindegewebiger Grundlage, bald dichtgedrängt, bald in weiten Zwischenräumen Schweissdrüensschläuche zu. Ein Theil derselben endigt am Strange nach kurzem Laufe, ein anderer Theil läuft entlang dem Strange auf die Zapfenbasis zu. Nur wenige Schläuche durchbrechen das Stratum corneum und

münden frei nach Aufsen; wenige sind gewunden; die Mehrzahl birgt ein Lumen. Weder im Stratum corneum noch im Rete ist eine Nagelanlage zu sehen.

Die Fäden wurden erst nach dem Einschluss in Paraffin und nach dem Schneiden der Färbung unterworfen. Der eine, mit Pikrocarmin gefärbt, gleicht auf dem Querschnitt einem Knäuel von kugligen und balkigen Gebilden, in dessen Buchten eine vielfach unterbrochene einzellige Schicht dunkelroth gefärbter, geschrumpfter Zellen eindringt. Das Gerüst des Knäuels baut sich aus einem Filzwerk hellroth gefärbten jugendlichen Bindegewebes und gelber elastischer Faermassen auf. -- Der zweite Faden zeigt auf dem Querschnitt Sichel- und zackige Umrandung. Selbst Hämatorylintinction bringt keinen Zellenfaum zum Vorschein; nur eine theils streifige, theils rissige Grundsubstanz und, in ihr zerstreut, geschrumpfte Zellen werden sichtbar.

Die gelieferte mikroskopische, die innere und äussere Untersuchung und — ein Blick auf die Figuren veretzen uns in das Reich der Mißbildungen.

Es ist ein Reich, in welchem die Naturwissenschaften die Herrschaft behaupten. Stein-, Pflanzen- und Thier-Kunde wetteifern, bis in mikroskopische Einzelheiten normale und anormale Formen zu scheiden. An Zellen und Kry stallen erschöpfen sie sich, überlassen der Physik und Chemie, zu ergründen, ob es mißbildete Molekel und Atome gibt.

Nicht mehr bilden die Mißbildungen eine eigene Schöpfung. Auf analytischem wie synthetischem Wege hat die Erkenntniß sich Bahn gebrochen, daß wie Krankheit und Gefundheit keine physiologischen Gegensätze, so Wohlgestalt und Mißform keine morphologischen sind.

Die Grundlage für eine Deutung der Mißbildungen ist

in dieser Erkenntniss gegeben. Auf ihr fussen wir, indem wir die Erklärung der vorliegenden Mißbildung wagen.

Wie alt ist das Kind, ist es ausgetragen? hat es geathmet? und wenn es geathmet, nach der Geburt noch gelebt hat, ward es getödtet oder starb es natürlichen Todes? — sind Vorfragen, welche die Erklärung des Kindes an uns stellt.

Für das Alter liefert die Körperlänge den sichersten Maassstab. Die Länge von 31,5 Cm weist unser Kind in den Anfang des siebenten Monates. Das Körpergewicht, das Vorhandensein einer Pupillarmembran und das Getrenntsein der linken Augenlider, die Beschaffenheit der Nägel und die Form der Schweißdrüsen im Fingerzapfen sind ein weiterer Anhalt für diesen Zeitraum.

Das völlige Fehlen von Knochenkernen in den Condylen der Oberschenkel läßt an ein Ausgetragensein des Kindes nicht denken.

Der Möglichkeit, daß das Kind athmete, steht von vornherein nichts im Wege, denn lebende Siebenmonat-Kinder machen bei der Geburt Inspirationen. Aber der sichere Nachweis stattgefundenener Athmung ist in unserem Falle selbst durch die Schwimmprobe der Lungen nicht führbar.*)

*) Wer sagt, daß dem Kinde nicht künstlich Luft eingeblasen wurde? — Daß Lungen, welche wie in unserem Falle in Weingeist gelegen haben, auf dem Wasser schwimmen ist überdies aus drei Gründen nicht für die Annahme von Lufteintritt durch die Athmung verwerthbar. Einmal ist das spezifische Gewicht des Weingeistes geringer, als das des Wassers und kann ein Gewebe in Folge Durchtränkung mit Weingeist leichter als Wasser werden. Zu Zweit wird bei der Mischung von Weingeist und Wasser meist Luft, welche in ihnen enthalten war, ausgetrieben und kann ein durchweingeistigtes Gewebe beim Gerathen ins Wasser durch solche an seiner Peripherie sich entwickelnde Luftblasen zum Schwimmen gebracht werden. Zu Dritt kann ein bluthaltiges Gewebe wie die Lungen durch die Austreibung der Blutgase beim Eindringen von Weingeist emphysematös anschwellen und dadurch in ähnlicher Weise zum

Gleichviel ob Siebenmonat-Kinder athmen, fast alle gehen nach kurzem Leben an Schwäche zu Grunde. Vielleicht ist vorliegendes Kind auf diesem natürlichsten Wege gestorben. Aber die geheimnißvolle Art seiner Einlieferung erweckt den Verdacht, daß die eigene Mutter das Kind aus dem Wege räumte, dem Hausmeister fälschlich sich als die Hebamme ausgab. Indessen nirgends sind Spuren eines Mordes zu finden. *) Das Kind ging vermuthlich von selber zu Grunde und wenn nicht an Schwäche, so wegen Mangels der Choanen; der Genuß von Nahrung, das Saugen war dem Kinde erschwert, da ihm beim Schlucken die Luft ausging.

Zur Erklärung der Mißbildung ist der Geburtsakt herbeizuziehen. — Aus der Beschreibung läßt sich entnehmen, daß wir es mit traumatischen, bei der Geburt erworbenen Anomalien neben solchen zu thun haben, die angeboren sind und aus der fötalen Zeit stammen.

Wie die Geburt im Einzelnen ablief, läßt sich bei dem Mangel einer Anamnese nicht sagen. Doch aus der blutigen Durchtränkung der rechten Stirnhaut wie der darunter befindlichen Dura-Primordial-Haut, aus den am Gehirn in Stirn- und Hinterhaupts-Lappen gefundenen Hämorrhagien läßt sich der Schluß ziehen, daß trotz der Kleinheit des Kindes die Geburt nicht glatt ablief. Hämorrhagien und Sugillationen aus früherer fötaler Zeit herzuleiten ist bei dem Fehlen entzündlicher Erscheinungen an den Hirnhäuten wie an den den Sugillationen gegenüber gelegenen Fruchthautabschnitten nicht statthaft. Der Zusammenhang zwischen kindlichem Kopf und

Schwimmen gebracht werden wie Leichen durch sich in ihnen entwickelnde Fäulnißgase. — Aber außerhalb der Lungen gibt es Kennzeichen stattgefundener, mehre Tage lang stattgefundener Athmung! Harnsäureinfarcte in den Nieren werden als solche bezeichnet. Auch sie fehlen in unserem Falle.

*) Sugillationen im Halsgewebe, die auf Erdrofflung, Petechien der Lungenpleurae, die auf Erstickung, abnorme Befunde im Magen und Darm, die auf Vergiftung hinweisen — sie alle fehlen.

Placenta deutet auf gleichzeitigen Austritt von Frucht und Fruchthäuten. Der gegenüber dem Nacken des Kindes am Rande der Placenta gelegene Eihautrifs weist auf Placenta praevia und Geburt in der Kopflage. Die seitliche Lage des Risses, die Glätte seiner Ränder sprechen für spontanes Bersten der Eihäute und dagegen dafs das Kind in geschlossener Eihaut zur Welt kam. Zugleich erklärt jene seitliche Lage des Risses warum das Amnion die Innenwand der Eihauttasche auskleidet, statt dafs es sich wie gewöhnlich bei der Geburt über die uterine Placentafläche zurückschlug. Die Kürze der amniotischen Fäden, die kleine Oberfläche der vorderen Taschenwand selbst bei der Dehnung berechtigen zu dem für die weitere Erklärung bedeutsamen Schlusse, dafs nur geringe Menge von Fruchtwasser, jedenfalls kein Hydramnion vorhanden war.

Sicherlich beim Bersten des Fruchtsackes und dem nachfolgenden Austritt von Frucht und Fruchthäuten kamen die Verletzungen zu Stande, die wir als erworbene Anomalien bezeichneten. Es rissen Verwachsungen zwischen Kind und Fruchthäuten.

Zwischen welchen Theilen die Verwachsung gelöst ward, wird bei Aneinanderpassen der Risstücke sichtbar. — Bei der Beschreibung bereits ward der Zusammenhang festgestellt, der zwischen placentarem Verwachsungsstrange und Scheitelhaut vor Einrifs des Scheitelspaltes bestand. Für die jenem Strange entspringenden amniotischen Bänder ward der Zusammenhang nur vermuthet. Dafs ein solcher bestand, dafs linker Gesichtszipfel mit linkem amniotischen Bande, der mittlere und rechte Zipfel beziehlich mit mittlerem und rechtem Bande vereinigt waren, wird aus der gegenseitigen Lage von Bändern und Zipfeln und aus der Beschaffenheit ihrer Rissflächen erwiesen. In gleicher Weise stellen Lage und Endigungsart des vierten, in Fig. I bei a⁴ gelegenen amniotischen Bandes dessen Zusammenhang mit der Fadenranke R der linken

Hand außer Zweifel. Für das dem linken Fuße entspringende Fadenwerk ist kein eigenes amniotisches Ansatzband zu ermitteln. Die Annahme, daß seinen drei Aesten die drei Zipfel am Nabelstrange entsprächen, ließe nur dann sich hören, wenn Rißflächen an diesen nachweisbar wären. Auch für die zwei Fäden, die den Händen entwunden wurden, lassen sich nur vermuthungsweise Beziehungen zu den Amnionfortsätzen finden.

Den erworbenen Anomalien des Kindes stehen die angeborenen entgegen. Sie beziehen sich theils auf dessen Haltung, theils auf die Form der einzelnen Körperteile.

Die Frage nach der Haltung des Kindes führt von Neuem in die Zeit vor der Geburt. Lage, Stellung und Haltung im engeren Sinne werden hier vom Geburtshelfer getrennt. Die muthmaßliche Lage ward bei Besprechung des Geburtsacts erörtert. Auf die Stellung wie die Haltung läßt sich aus den Angaben der Beschreibung und den eben besprochenen Verwachsungen schließen. Statt daß sich das Kind an der Nabelschnur wie eine Frucht am Stiele frei nach den Seiten hätte bewegen können, ward es durch die Verwachsungen nach verschiedenen Seiten befestigt. — Nicht genug der mechanisch anormalen Verbindung war auch die Ernährungsverbindung zwischen Kind und Fruchthäuten fehlerhaft. Zumindest für den rechten Gesichtszipfel und das rechte amniotische Band, für den Verwachsungsstrang zwischen Mutterkuchen und Kindskopf steht ein Gefäßsaustausch außer Frage. Die fleischige Natur des linken Kopfzipfels und Amnionbandes spricht dafür, daß auch in ihnen Gefäße der Mutter und des Kindes sich austauschten. Ob in den amniotischen Fäden, die zu Händen und Füßen zogen, Gefäße verliefen, bleibt zweifelhaft, da bei mikroskopischer Untersuchung selbst im wohl erhaltenen Fingerfaden keine Gefäße sich fanden. Jedenfalls übten die Fäden eine mechanische Wirkung, halfen bei der Verkrümmung von Händen und Füßen.

Diese Verkrümmung bezeichnet die auffallendste Anomalie in der kindlichen Haltung. Die Equinovarus-Krümmung des linken, die Valgus-Stellung des rechten Fusses können nicht als normale foetale Fußkrümmungen gelten; denn nur Ueberstreckung oder Varus-Stellung werden als solche bezeichnet. Die Art der Verkrümmungen macht es wahrscheinlich, daß im Mutterleibe der linke Fuß über dem rechten gekreuzt lag, dieser jenem von der fibularen Seite entgegenkam. Für die Handkrümmungen läßt keine gegenseitige Beziehung sich finden. Beide Hände waren offenbar einzeln an den Brustkorb gepreßt. Beide zeigten bei Ueberlieferung des Kindes eine derartige Abplattung, daß sie ebenfogut Plathände wie Klumpfüße genannt werden konnten. Auch die vorliegende Linksdrehung des Halses hat als pathologische Krümmung zu gelten. Mit ihr im Zusammenhang steht, daß die Gesichtszipfel links aufwärts verlaufen, daß der Schädel links unvollkommener entwickelt und die Schädelbasis nach links verzerrt ist.

Unter den Formanomalien des Kindes fallen die des Gesichts am meisten ins Auge. Die Verunstaltungen desselben sind so seltsam, daß man nicht ohne Weiteres die vorhandene Hasenscharte, den Lagophthalmus, die Rüsselnase erkennt. Wie, wenn nicht Hasenscharte, soll man die Spalte der Oberlippe bezeichnen? Der Lippenfaum sammt der Rille, die auf den mittleren Gesichtszipfel fortziehen, deuten an, daß dieser den ausgezogenen rechten Gesichtslappen darstellt. Einen Lagophthalmus eigener Art bietet das rechte Auge. Die stirnwärtige Transplantation des oberen Lides machte den Lid-schluss unmöglich, verhinderte die Verklebung der Lidränder. Das obere Lid selbst ist gespalten, wie aus den Cilien hervorgeht, die zu beiden Seiten der dreieckigen Hautlücke liegen. Die Ausfüllung dieser Lücke besorgt die Conjunctivalhaut, die einem aufgeschnittenen Sack gleicht. Der Furchendreizack, der in ihr auftritt, steht zu der Spaltung des Lids in Beziehung. Die Undurchsichtigkeit der rechten Hornhaut mag auf

foctaler Keratitis, diese ihrerseits auf Einwirkung des Fruchtwassers und auf Reibung der Hornhaut an der gegenüberliegenden Fruchthaut beruhen. Die Trübung der Hornhaut des linken Auges und die beider Linfen kann Wirkung des Weingeistes sein. Die Oeffnung Y', welche in Fig. II der Hornhaut entgegen im linken Winkel des Dreieckes liegt, ist nur als Oeffnung des rechten Nasengangs deutbar. Durch einen schmalen Hautbalken vom rechten Nasenloche getrennt ist sie die Mündung zwischen rechtem Nasen- und Lid-Raum. Der obere Winkel des Dreieckes ist nicht das Ende des Lidspalts. Eine Furche, welche von ihm auf den Stirnzapfen fortzieht, kennzeichnet diesen als theilweis zum Lide gehörig. — Der linke Gesichtszipfel gleicht in der Form einem Schweinsohr; seine Beziehung zum linken Nasenraume läßt ihn als Rüssel erscheinen.

Die regelwidrige Bildung des übrigen Schädels betrifft vorwiegend die Knochen des Schädeldaches. Die mangelhafte Entwicklung der meisten Belegknochen, die zum Theil noch knorplige Natur der Primordialknochen gehen aus der Beschreibung hervor. Die drei Hervorragungen am Schädel sind der äußere Ausdruck der ihnen entsprechenden Knochenlücken. Die Hervorragung der Stirn wie die in der Scheitelgegend stammen vermuthlich von der Geburt her. Die blutige Durchtränkung der rechten Stirnhaut legt für erstere diese Annahme nahe; für den Scheitelhöcker wird sie durch dessen Gehalt an Hirnflüssigkeit und dadurch wahrscheinlich, daß die Scheitelhaut in feiner Nähe durchrissen ist und hiedurch bei der Geburt einem Drucke von Innen ein verminderter Widerstand der Schädelhülle sich darbot. Der Hinterhauptshöcker muß aus fötaler Zeit stammen, denn die ihn auskleidende Primordialhaut stellt einen Sack dar, dessen Außenwand eine Strecke weit mit der Außenfläche der Hinterhauptschuppe verwachsen ist.

An Händen und Füßen fallen Ringfurchen und verküm-

merte Glieder als beiden gemeinfame Formwidrigkeiten ins Auge. Die Mehrzahl der Furchen von Umschnürungen herzu-
zuleiten liegt um so näher, als aus zweien derselben Fäden entwunden wurden und der Versuch unschwer gelingt für die einzelnen Hände und Füße die Furchen durch je einen Faden im Zusammenhang zu umschnüren.

Das Fehlen einzelner Gliedenden, insbesondere des Endes der rechten Großzehe ist auf Abschnürung durch Fäden zurückzuführen. Die Verwachsung der Haut jenes Zehenstumpfes mit dessen Knochenkern ist ein Zeichen für intrauterine Amputation. Wo im Anschluß an eine Furche verkümmerte Phalangen sich finden, ist an Störung der Ernährung durch Umschnürung zu denken. — Der besonderen Erwähnung wohl werth ist die Erscheinung, daß im Mutterleib unter Erhaltung der Haut Glieder abgeschnürt werden, insofern sie an die von den Chirurgen benützten Ligaturen erinnert, welche selbst Knochen zum Schwund bringen können ohne die bedeckende Haut zu durchtrennen. Die verschiedene Elasticität der Gewebe mag hier von gleicher Bedeutung sein wie bei der künstlichen Unterbindung der Gefäße. Daß die abgeschnürten Theile bei der Geburt häufig im Fruchtwasser fehlen, weist darauf hin, daß schon in früher Zeit die Trennung erfolgte, insofern Kleinheit der abgetrennten Glieder und langes Verweilen im Fruchtwasser für eine völlige Resorption günstig sind. Auch für organisirte, zwischen benachbarten Theilen ausgespannte Strangwerke ist eine solche Resorption möglich, wie der Schwund strangförmig organisirter Exsudate in serösen Höhlen erweist. Für unsern Fall ist dies dahin verwerthbar, daß Theile amniotischer Fäden, selbst wenn sie Gefäße enthielten, durch Resorption in ihrem Zusammenhang unterbrochen und bis auf die Stümpfe verzehrt werden konnten. Eine besondere Beachtung verdient das an der linken Hand ausgespannte amniotische Fadendreieck, sowohl deshalb, weil es an die von den Chirurgen umstrittene permanente Handbeugung

erinnert, als weil man zweifelhaft sein kann, ob es ein cutanes, der Hand ursprünglich eigenes Fadenwerk darstellt oder durch amniotische Verwachsung bedingt ist. Bezüglich der permanenten Beugung mag erwähnt sein, daß der vorliegende Fall eine neue Art derselben darstellt, da bisher der Streit nur darum geführt ward, ob subcutane Strangbildung oder Schrumpfung der Palmaraponeurose jene Beugung herbeiführe. Rücksichtlich der besonderen Natur unseres Fadenwerkes mag dessen Zusammenhang mit der Fadenranke entscheiden, welche zweifellos amniotischen Ursprungs ist. Die Entscheidung, wie weit im Einzelfalle ein zwischen Haut und Amnion ausgespannter Faden von diesem oder jener abstammt, ob gar nur das eine oder das andere, kann überaus schwer sein. Denn Amnion und Körperhaut sind gleichen Ursprunges, jenes ist nur eine Fortsetzung der letzteren. Kaum wird das Fadendreieck ursprünglich als solches angelegt sein, vielmehr eine amniotische Membran zwischen den drei Fingern bestanden haben, die beim Wachsen der Finger einriß und an ihren Fingeransätzen mit den noch vorhandenen Verdickungen des Fadendreiecks bestehen blieb.

Eigener Art ist der Zapfen X, der am Fingerkegel der linken Hand vorragt. Mit Hinblick auf das Fehlen eines der Finger und auf die Lage des Zapfens zwischen ulnarem und mittlerem Finger könnte man glauben, daß im Zapfen der rudimentäre Nachwuchs des vierten Fingers vorliege. Aber weder die Zergliederung des Fingerkegels und des zugehörigen Metacarpus noch die mikroskopische Prüfung des Zapfens rechtfertigen diesen Glauben. Letztere ergab, daß der Zapfen überhaupt keinen Finger darstelle, daß er des Nagels entbehre, als einfache Hautbildung gelten müsse. Die Zergliederung erwies den gelenkigen Zusammenhang zwischen der I. Phalanx des Fingerkegels und dem ulnaren Metacarpusknochen, sowie daß dieser mit der Cartilago capitata und hamata articulare. Da letztere Verbindungsart dem vierten, nicht

dem fünften Metacarpusknochen zukommt, ist das Fehlen des letzteren wahrscheinlich gemacht und damit zugleich, daß der Finger, welcher dem ulnaren Metacarpusknochen ansitzt, der vierte ist. Zur Gewissheit mag dies dadurch erhoben werden, daß der Metacarpusknochen und die Phalangen des ulnaren Fingerballens nicht dicker sind, als die entsprechenden Bildungen der übrigen Hand, nicht als Verschmelzung zweier Mittelhandknochen und zweier Phalangenreihen gelten können.

Mithin liegt einer der seltenen Fälle von Oligodactylie vor. Ob auch von rudimentärer Reproduction eines Fingers ist trotz dem Gefagten nicht ohne Weiteres verneint. Vielleicht daß der im Inneren des Zapfens gefundene Bindegewebsstrang eine Fingersehne darstellt, die von einem der Muskeln des Fingerkegels ausging. Vielleicht daß Manche nicht einmal ein solches Merkmal für nöthig finden, um einen rudimentären Finger in jenem Zapfen zu sehen. Wer dies thut, kann mit His die Wanderung einer Organanlage annehmen, die Verlagerung des fünften Fingers en miniature — von der ulnaren Handseite auf die radiale Seite des Fingerkegels behaupten, während daß damit zugleich eine Erklärung für die erhebliche Dicke des Fingerkegels gegeben sei.

Erwähnung verdient die Nachbarschaft des Hautzapfens mit dem Ansatz eines amniotischen Fadens, insofern eine solche auch am Ballenstumpfe des linken Fußes zwischen der hügelartigen Hautknospe und zwischen dem Fadenbaume sich findet. Die schmale Hautbrücke, welche über eine Rückenfurche dieses Stumpfes sich ausspannt, stellt im Gegensatz zu dem Fadendreieck der linken Hand ein entschieden cutanes Gebilde dar.

Auf die Deutung der Haltungs- und Form-Anomalien im Einzelnen folgt die Darstellung ihres Zusammenhanges und die Frage nach ihrer Ursache.

Von Vornherein muß das Zusammentreffen der drei häufigsten Mißbildungen bei unserem Foetus auffallen. Klump-

füße, Torticollis und Hafenscharte sind dies nach dem Zeugnisse Dieffenbachs. Klumphände gefellen sich bei vorliegendem Kinde zu den Klumpfüßen, können ihm den Namen Tolpatfch verschaffen, wenn man Tolpatfch von Talipomanus, nicht von Talipes ableiten will. Das gleichzeitige Vorhandensein der drei häufigsten Mißbildungen und von Strängen zwischen Frucht und Fruchthäuten erinnert an jene Lehre, nach welcher alle Mißbildungen von solchen Strängen, von Brides placentaires, stammen sollten. Bezüglich der Hafenscharte giebt der jüngere Geoffroy Saint-Hilaire diese Entstehungsart zu. Unser Fall giebt ihm Recht, da ein placentarer Strang zum rechten Abschnitt der Oberlippe verläuft. Als amniotisches Band ward dieser Strang in der Beschreibung bezeichnet, dem deutschen Sprachgebrauche gemäß, der von „amniotischen Bändern“ allgemein bei anormalen Verbindungen zwischen Kind und Eihäuten redet. Von Rechtswegen sind jenes Lippenband sowie die zwei anderen Gesichtsbänder und insbesondere der breite Hinterhauptsstrang als Brides placentaires zu bezeichnen.

Die gemeinsame Ursache der Haltungs- und Form-Anomalien ist in der geringen Menge von Fruchtwasser und dem daraus sich ergebenden Anliegen der Fruchthäute am kindlichen Leibe zu suchen. Druck brachte im Allgemeinen die regelwidrige Haltung, Zug im Allgemeinen die Formwidrigkeiten zu Stande. Damit Zug erfolgen könne, mußten sich Verbindungen zwischen Frucht und Fruchthäuten bilden. Die Lehre von den amniotischen Bändern stellt eine Anzahl Entstehungsweisen für diese Verbindungen auf. Es wird von Verwachsung zwischen Amnion und Kindshaut in Folge Entzündung geredet, von einer Verlöthung durch Organisation entzündlicher Exsudate im Fruchtraum und neuerdings mit Vorliebe von einer rein mechanischen Verbindung durch Umschnürung der Kindstheile seitens amniotischer Falten. Die letzteren sollen sich bilden, wenn die vier Zipfel des Amnion sich nicht gehörig vom Kindsleibe abheben, sich an dessen

Vorragungen verfangen. Aber nach dem Materiale zu schliessen, das aus der Zeit der Bildung des menschlichen Amnion vorliegt, hat Niemand jene Zipfel gesehen. Nicht einmal die von His am Hühnchen gemachten Erfahrungen lassen sich für den Menschen verwerthen, denn die vier von His beim Huhn angenommenen amniotischen Falten sind als solche überhaupt nicht vorhanden und keinesfalls in der Art, wie er sie zur Stützung seiner Lehre von Kopf- und Rumpf-Krümmung des Hühnchens angiebt. Kapuzenartig schiebt sich eine vordere Amnionfalte über das Hühnchen ohne dafs, wie His will, selbständig seitliche Amnionfalten und eine hintere sich bilden. — Gleichviel in welcher Form das Amnion sich über den Rücken des Embryo schlägt, es kann sich bei mangelhafter Abhebung in Falten legen und dies um so mehr, als gleichzeitig mit der Bildung des Amnion die der Glieder stattfindet. Die fingerigen Endlappen der Glieder können sich in Amnionfalten eindrängen, diese Falten zu Fäden ausziehen und bei folgender Gliedrotation geradezu von den Fäden umschnürt werden. — Amniotische Umschnürungen können angeblich auch dadurch zu Stande kommen, dafs in vorgerückter foetaler Zeit das Amnion einreißt, vom Chorion sich abhebt und kragenartig auf den Foetus sich überschlägt. Dem Zurückspringen der Linsenkapfel beim Einreißen durch das Cystitom mag man diesen Vorgang vergleichen. — Was die Bildung von Exsudatsträngen im Fruchtraume anlangt, so bleibt voraussichtlich unentschieden, wie weit das Kind, wie weit die Mutter das Material dazu liefern kann, so lange nicht feststeht, wie weit beide an der Bildung des normalen Fruchtwassers theilnehmen. Die Entzündung, welche die Exsudatmassen liefert, kann bei Anliegen von Kind und Amnion zu Adhäsionen führen und hierdurch neben den Exsudatsträngen direkte Verwachsung zu Stande kommen. Jenes Anliegen wird dadurch begünstigt, dafs das spezifische Gewicht des Foetus das des Fruchtwassers überwiegt. Insbesondere der Kopf als schwerster Kindstheil

wird sich dem Amnion anlegen. Die Bewegungen des Kindes und der Mutter freilich sind einem dauernden Anliegen widrig. — Der Reiz, welcher eine adhäsive Entzündung herbeiführt, kann unter Anderem durch Reibung und Meconiumgehalt des Fruchtwassers bedingt sein.

Auch nachdem Verwachsungen zwischen Frucht und Häuten erfolgten, kommen mechanische Kräfte zur Geltung. Sowohl Zunahme des Fruchtwassers als Wachsen der Frucht können zu Ausziehung der Verbindungen führen. Beide Momente können schliesslich ein Durchreißen der Fäden bewirken.

Dafs die Fäden in tropfbarer Flüssigkeit ausgespannt sind verschafft ihnen eine grössere Festigkeit im Vergleich zu jener, welche sie nach der Geburt in der Luft zeigen. Denn unschwer ist aus dem Archimedischen Principe zu folgern, dafs ein Körper in einem Medium in dem Verhältnifs an Festigkeit zunimmt, als er in demselben am Gewichte verliert.

Erwähnt sei auch, dafs gleichstarke Bewegungsimpulse des Foetus im Fruchtwasser geringeren Nutzeffekt äufsern, als nach der Geburt in der Luft, dafs ein Durchreißen der Fäden auch aus diesem Grunde in der Luft leichter wird, als vor der Geburt im Fruchtwasser.

Berichtigungen.

Pag. 13. Zeile 2 von U.

ist statt »Nase« — »Nasengegend« zu lesen.

Pag. 19. Absatz 1.

hat der Satz »Hand wie Finger waren in dieser Haltung zum Theil durch innere Steifigkeit, zum Theil durch äussere Strangverbindung festgehalten.« auszufallen:

Pag. 26. Zeile 8 v. U.

ist »Schläfenbeinen« an Stelle von »Scheitelbeinen« zu lesen.

Pag. 37. In der Mitte

lies »Hämatoxylintinction«.

Pag. 38. Anmerkung. Zeile 4 v. U.

hat an Stelle von »solche« — »solcherart« zu stehen.

Erklärung der Figuren.

Fig. I. Eihäute, Kopf und rechte Hand des Kindes in situ und in natürlicher Grösse.

P	Placenta.
C	Chorion und Deciduareste.
A	Amnion.
a ⁰ , a	Amniotische Zipfel.
a ¹ , a ² , a ³	Amniotische Bänder.
a ⁴	Gegend eines von der hinteren Taschenwand entspringenden, von der vorderen verdeckten amniotischen Bandes.
N	Nabelstrang.
c	Chorda funiculi.
V	Verwachsungsband zwischen Kind und Placenta.
S	Cutisspalte in der Scheitelgegend.
g	Ansatzlinie der Grosshirnsichel.
II ¹	Hervorragung in der Stirngegend.
H ²	Hervorragung in der Scheitelgegend.
II ³	Hervorragung in der Hinterhauptsgegend.
Z ¹	Rechter Gesichtszipfel.
Z ²	Mittlerer Gesichtszipfel.
Z ³	Linker Gesichtszipfel.
R	Rechte Hand.
f ¹	Furche, in welcher ein amniotischer Faden gefunden wurde.

Fig. II. Kopf des Kindes in natürlicher Grösse. Eihäute abgetrennt. Mittlerer Gesichtszipfel zurückgeschlagen.

Y¹ Oeffnung des rechten Nasenthränenganges.

Y² Rechtes Nasenloch.

Die übrigen Bezeichnungen wie in Fig. I.

Fig. III. Linke Hand und untere Hälfte des linken Unterarms von der Beugeseite und in natürlicher Grösse.

K Ulnarer Fingerkegel.

D Fadendreieck. "

R Fadenranke.

X Fingerzapfen.

f² Furche, in welcher ein amniotischer Faden gefunden wurde.

Fig. IV. Ulnare Hälfte der linken Hand von der Beugeseite und doppelt vergrössert.

Die Bezeichnungen wie in Fig. III.

Die Figuren sind Lichtdruckwiedergaben aus der Anstalt der Herren
Dr. C. Wolf & Sohn nach Originalzeichnungen des Herrn C. Krapf.

Fig. III. Linke Hand und untere Hälfte des linken Unterarms von der Beugeseite und in natürlicher Grösse.

K Ulnarer Fingerkegel.

D Fadendreieck.

R Fadenranke.

X Fingerzapfen.

f² Furche, in welcher ein amniotischer Faden gefunden wurde.

Fig. IV. Ulnare Hälfte der linken Hand von der Beugeseite und doppelt vergrössert.

Die Bezeichnungen wie in Fig. III.

Die Figuren sind Lichtdruckwiedergaben aus der Anstalt der Herren
Dr. C. Wolf & Sohn nach Originalzeichnungen des Herrn C. Krapf.




Fig. I.




Fig. II.






Fig. IV.



Fig. III.



